

<p>Universitätsklinikum Essen</p> <p>Institut für Experimentelle Immunologie und Bildgebung</p> <p>Standort IMCES am MFZ</p>	<h1>Hautschutzplan</h1> <p>für die Räume</p> <p>1.034, 1.035, 1.036, 1.037, 1.038, 1.039</p>	<p>Version 1.0</p> <p>Stand 06.12.2017</p> <p>Seite 1 von 1</p>
--	---	---

WAS	WANN	WOMIT	WIE	WER
Umgang mit Gefahrstoffen oder Tieren	Vor Beginn des Arbeitsvorganges	Einweghandschuhe aus Nitril	anziehen	jeder
Tragen von Nitrilhandschuhen	Nitrilhandschuhe nicht länger als 2 Stunden am Stück und max. 4 Stunden am Tag tragen. Außerdem wird das Tragen von Unterhandschuhen aus Baumwolle empfohlen.			jeder
Thermischen Gefahren	Vor Beginn des Arbeitsvorganges	Schutzhandschuhe (Wärme- und Kälteschutzhandschuhe)	anziehen	jeder
Händedesinfektion	nach Beendigung eines generellen Arbeitsvorgangs, vor Verlassen des Labors	Sterillium classic pur 1 Spenderhub (=3 ml)	in die trockenen Hände bis zur Trocknung einreiben mindestens 30 s	jeder
	nach Virusarbeiten, vor Verlassen des Labors	Sterillium Virugard 1 Spenderhub (= 3 ml)	in die trockenen Hände bis zur Trocknung einreiben mindestens 30 s	jeder
Händereinigung	nach Händedesinfektion	Baktolin sensitive Flüssigseife aus Spender	waschen	jeder optional
Hautpflege	nach Händedesinfektion und –reinigung bei Bedarf	Stoko protect Handpflegecreme aus Tube	einreiben	jeder optional