

Klausur Mathematik für Ökonomen

05.02.2019, 09:30-11:30 Uhr (120 Minuten)

- Erlaubte **Hilfsmittel**: Nur reine Schreib- und Zeichengeräte.
Der Einsatz anderer Hilfsmittel – so z.B. schriftliche Unterlagen, elektronische Geräte wie **Handy** oder Rechner jeder Art – wird ohne genauere Prüfung der tatsächlichen Verwendung als Täuschungsversuch gewertet.
- Die Klausur muss **geheftet** bleiben.
- Bei **Klausurunterbrechung** müssen die Klausur und ein Ausweis bei der Aufsicht hinterlegt werden. Eine (gehäufte) vorzeitige Abgabe stört. In den letzten 30 Minuten ist daher **keine vorzeitige Abgabe** möglich.
- Während der Klausur können **keine Fragen** zu den Aufgaben gestellt werden, die Aufgabenstellung entspricht genau der frühzeitig angekündigten und geübten Form.

Die Klausur besteht aus **10 Aufgaben**,
dabei sind die erreichbaren Punkte auf dem Deckblatt und zusätzlich auch an jeder Aufgabe
kenntlich gemacht. Insgesamt sind **50 Punkte** erreichbar.
Ab erreichten **23 Punkten** ist die Klausur bestanden, **gutes Gelingen!**

Platznummer

Matrikelnummer

Name

Vorname

Geburtsdatum _____

Ich habe obige Punkte gelesen.

Meine Personendaten habe ich korrekt angegeben:

Unterschrift _____

NUR für Teilnehmer im DRITTEN Versuch, die eine frühzeitige Bestehensbenachrichtigung wünschen.
Direkte eMail-Adresse (bitte gut lesbar):

Einträge der Klausuraufsicht:

Unterbrechungen

Abgabe

Abschnitt für Korrektur!

Thema: Lineare Ungleichungssysteme


[3] Bestimmen Sie die Lösungsmenge L des folgenden Ungleichungssystems und skizzieren Sie sie:

(1) $-2 \cdot x \leq -3$

(2) $3 \cdot y + 2 \cdot x \leq 18$

(3) $x - 3 \cdot y \leq 0$

(4) $4 \cdot y + 2 \cdot x \geq 10$



(Ersatzvorlage siehe Anhang)

Thema: Rechnen mit Matrizen

- [4] Bei einem zweistufigen Produktionsprozess sind die beiden folgenden (einstufigen) Bedarfstabellen gegeben:

		Endprodukte					Zwischenprodukte		
		E_1	E_2	E_3			Z_1	Z_2	Z_3
Zwischenprodukte	Z_1	1	1	0	Rohstoffe	R_1	1	2	1
	Z_2	2	1	2		R_2	2	1	1
	Z_3	2	0	1					

Rohstoffpreise $r = (r_1, r_2) = (3, 2)$.

- (a) Berechnen Sie M_{RE} , die Bedarfstabelle der Gesamtverarbeitung.

- (b) Welcher Rohstoffbedarf $R = \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \end{pmatrix}$ entsteht bei der Endproduktion $E = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$?

Und welche Rohstoffkosten entstehen hierbei?

Thema: Anwendungen des Gauß-Jordan Algorithmus

- [2] (a) Bestimmen Sie aus dem folgenden Schlusstableau eines Gauß-Jordan-Algorithmus die Lösungsmenge L_b des zugehörigen linearen Gleichungssystems $Ax = b$.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b^*
1	2	3	0	0	0	$\xrightarrow{\text{Gauß-Jordan}} \dots \xrightarrow{\phantom{\text{Gauß-Jordan}}}$	1	0	0	0	0	1/9
4	5	9	0	0	0		0	1	0	0	0	1/9
7	8	6	0	0	1		0	0	1	0	0	-1/9
0	0	0	2	2	4		0	0	0	1	0	7
0	0	0	3	4	1		0	0	0	0	1	-5
5	7	12	0	0	0		0	0	0	0	0	0

- [4] (b) Bestimmen Sie die Inverse der folgenden Matrix B mit Hilfe des Gauß-Algorithmus (tabellarisch, mit irgendeinem nachvollziehbaren Protokoll der Lösungsschritte).
Geprüft wird die Beherrschung der Methode - eine auf anderem (unsystematischen) Weg gefundene Lösung bleibt unbewertet.

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Thema: Zinsrechnung

Voraussetzung: Jährliche Verzinsung (Zinseszins) und ein Anfangswert $K_0 > 0$.

- [2] (a) Gegeben: Laufzeit $n = 5$. Wie hoch ist die erforderliche Rendite $i = p\%$, damit der Zielwert K_5 um 20% über dem Anfangswert K_0 liegt?
- [2] (b) Gegeben: $i = 10\%$ und ein Zielwert K_x , der 20% über dem Anfangswert K_0 liegt. Erforderliche Laufzeit $n = ?$
(d.h. mit der n -ten Verzinsung soll K_n erstmals die Bedingung $K_n \geq K_x$ erfüllen)
- [2] (c) Gegeben: Laufzeit $n = 5$ und Zinsstaffel 10%, 0%, 10%, 21%, 10%. Berechnen Sie den Zielwert K_5 bei einem Anfangswert von $K_0 = 100000$ und den effektiven Zinssatz i_{eff} .

Hilfswerte: $1.2^{\frac{1}{5}} \approx 1.04$, $\ln 1.25 \approx 0.22$, $\ln 1.2 \approx 0.18$, $11^5 = 161051$, $\ln 1.1 \approx 0.1$

Thema: Stetigkeit von Funktionen mit 1 Variablen

[3] Überprüfen Sie, ob die folgende Funktion f an der „Nahtstelle“ $x_0 = -2$ *stetig* ist:

$$f(x) = \begin{cases} (4 \cdot |x|)^{1/3} & \text{für } -3 \leq x < -2 \\ 2 + \ln(3 + x) & \text{für } -2 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Thema: Optimierungsaufgaben mit 1 Variablen

Gegeben $f(x) = e^{(x-2)^4 - 4 \cdot x}$ mit $D(f) = [0, 4]$. Beachte: 1. Ableitung ist gegeben!

f hat die Ableitung $f'(x) = e^{(x-2)^4 - 4 \cdot x} \cdot (4 \cdot (x-2)^3 - 4)$.

- [3](a) Bestimmen Sie auf Basis dieser Information alle lokalen Maximal- und Minimalpunkte (Maximal- bzw. Minimalstellen und zugehörige Funktionswerte) von f über dem Definitionsbereich.
- [3](b) Untersuchen Sie auf globale Maximal- und Minimalpunkte (Maximal- bzw. Minimalstellen und zugehörige Funktionswerte) von f über dem Definitionsbereich.

Thema: Elementare Berechnung von Integralen

[4] Berechnen Sie das Integral $\int_{1/2}^{e^2} f(t) \, dt$, wobei $f(t) = \begin{cases} 4 \cdot t^3 - 7/t^2 & \text{für } 1/2 \leq t < 1 \\ 3 \cdot t^{-1} & \text{für } 1 \leq t \leq e^2 \end{cases}$

Thema: Partielle Ableitungen

- [5] Berechnen Sie für die Funktion $f(x, y) = x^2 \cdot e^{x \cdot y}$ $(x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R})$
die partiellen Ableitungen f'_x , f'_y , sowie f''_{xx} , f''_{yy} und f''_{xy} (oder f''_{yx}).

Thema: Partielle und totale Marginalanalyse

[5] Die Gesamtnachfrage eines Gutes im EU-Wirtschaftsraum sei modelliert durch die Funktion $f(x, y) = 10 \cdot x^{-4} \cdot y^5$ mit Preis $x > 0$ und mittlerem Einkommen $y > 0$. Weiterhin sei die Basisstelle (x_0, y_0) mit $x_0 = 40$ und $y_0 = 10$ vorgegeben.

- (a) Bestimmen Sie die Preiselastizität \mathcal{E}_x^f und die Einkommenselastizität \mathcal{E}_y^f an der obigen Basisstelle.
- (b) Geben Sie eine Abschätzung für die relative Veränderung der Funktion f an der obigen Basisstelle, wenn sich dort der Preis um 1% vermindert und das mittlere Einkommen um 2% erhöht.

Thema: Optimierungsaufgaben mit 2 Variablen (mit oder ohne Nebenbedingung)

[8] Untersuchen Sie die Funktion

$$f(x, y) = \frac{x^4}{4} - 2 \cdot x \cdot y + \frac{y^2}{2} + 4 \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

auf (lokale) Extremwerte und Sattelpunkte.

(Ggf. angeben: Extremalstellen, Sattelpunktstellen und die zugehörigen Funktionswerte)